

Parásitos gastrointestinales

Problemática y control



INFORMACIÓN TÉCNICA



Las **parasitosis gastrointestinales** de **bovinos** y **ovinos** están producidas por parásitos, mayoritariamente nematodos, alojados en estómago e intestino. Generan lesiones, trastornos funcionales y compiten por el alimento.



Mundo
Veterinario



PARÁSITOS GASTROINTESTINALES, PROBLEMÁTICA Y CONTROL

- Causan pérdidas económicas debido a menores ganancias de peso, menor desarrollo reproductivo en animales destinados a reposición, menor producción de leche, menor calidad y peso del vellón.
- **En bovinos**, la categoría más afectada es la Recría, en el periodo que va desde el destete (marzo-abril) hasta mediados de primavera.
- **En ovinos**, la susceptibilidad parasitaria dura toda la vida y los cuadros pueden presentarse en cualquier época del año, con alguna temporalidad que depende de la categoría, la especie parasitaria y la región del país.
- Por muchas razones, es utópico pensar en la eliminación de los parásitos en un establecimiento. **El desafío productivo es convivir con cargas parasitarias que permitan producciones rentables**, por consiguiente, los tratamientos antiparasitarios no pueden ser la única herramienta utilizada.



221 314 4583

www.mundoveterinario.com.ar



**Mundo
Veterinario**



PARÁSITOS GASTROINTESTINALES

- Un programa de control parasitario debe ser sustentable en el tiempo, desde el punto de vista productivo, económico, de manejo y medioambiental. El uso de antiparasitarios debe estar incluido como una herramienta más dentro de un sistema estratégico y definido que contemple seguimiento de H.P.G. (Huevos por gramo), manejo de cargas parasitarias en pasturas y rotación en base a dichas cargas, pesadas testigo, etc. Esto debe estar gestionado por un profesional Veterinario que conozca la problemática del establecimiento.
- En **bovinos**, hay solo dos desparasitaciones anuales que se pueden tomar como fijas.
 - ➔ **Al destete:** busca eliminar la carga parasitaria acumulada durante el período de cría. Recomendamos el uso de productos con Levamisol por la escasa resistencia.
 - ➔ **A fines de primavera:** para controlar Ostertagia. Ivermectina o Benzimidazol (ajustar la dosis).

M.V. Jesús María Pesoa
Mat. Prov. 9297



221 314 4583

www.mundoveterinario.com.ar



**Mundo
Veterinario**



INFORMACIÓN TÉCNICA



ANTIPARASITARIOS INYECTABLES

ANTIPARASITARIOS ORALES



IVERMECTINAS



221 314 4583

www.mundoveterinario.com.ar



Mundo Veterinario